


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)


Influenza aviaire hautement pathogène

- En date du 17 août 2026, l'Australie a confirmé 251 cas d'IAHP H5 chez des oiseaux sauvages : 10 en **Australie-Occidentale**, 169 en **Australie-Méridionale**, 4 en **Nouvelle-Galles du Sud**, 1 dans le **Queensland**, 62 dans le **Victoria** et 5 en **Tasmanie**
- En **Australie**, un manchot de **Phillip Island** est mort de l'IAHP H5, quelques jours après que le gouvernement s'est engagé à vacciner ses oiseaux indigènes les plus vulnérables, y compris les espèces sauvages et les oiseaux en captivité

Pour en savoir plus




Pour en savoir plus




Virus apparenté au virus Shamonda

- Un nouvel orthobunyavirus « apparenté au virus Shamonda » a également été signalé aux **Pays-Bas** et sa présence est suspectée en **Belgique**. Aux **Pays-Bas**, des analyses de laboratoire ont détecté le virus chez plusieurs bovins répartis dans quatre élevages touchés par de la fièvre, de la diarrhée et une baisse de la production laitière ; des échantillons ont été transmis au Friedrich-Loeffler-Institut (**Allemagne**) pour confirmation. En **Belgique**, un cas suspect a été signalé chez une vache en **Flandre-Occidentale**, dans l'attente d'une confirmation.

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



Virus apparenté au virus Shamonda aux Pays-Bas et en Belgique

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** vecteur ; **Espèces concernées :** bétail

① Un nouvel orthobunyavirus apparenté au virus Shamonda a été signalé aux Pays-Bas et sa présence est suspectée en Belgique. Aux Pays-Bas, des analyses de laboratoire ont détecté le virus chez plusieurs bovins répartis dans quatre élevages touchés par de la fièvre, de la diarrhée et une baisse de la production laitière. Les analyses génétiques ont identifié le virus comme étant apparenté au virus Shamonda, et des échantillons ont été transmis au Friedrich-Loeffler-Institut (Allemagne) pour confirmation. En **Belgique**, un cas suspect a été signalé chez une vache en Flandre-Occidentale, dans l'attente d'une confirmation.

Pour en savoir plus

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	4

Virus de la fièvre catarrhale du mouton de sérotype 3 en Écosse

Agent pathogène : virus ; **Transmission :** vecteur ; **Espèces concernées :** mouton, bétail

① L'Écosse a confirmé un cas de FCM-3 chez des bovins, dans une exploitation du Dumfries et Galloway. Ce cas fait suite aux premières détections du virus chez un agneau et trois moutons dans trois fermes voisines la semaine dernière, portant à quatre le nombre total d'exploitations touchées dans la zone. Les autorités estiment que le virus a probablement été introduit par des moucheron infectés transportés par le vent depuis des régions touchées du Royaume-Uni. Plus de 100 animaux ont été testés sur place, tous les autres résultats s'étant révélés négatifs à ce jour.

Pour en savoir plus

Évaluation moyenne	2,7
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	7

Maladie porcine inconnue (suspicion de peste porcine africaine) à Tioumen, en Russie

Agent pathogène : inconnu ; **Transmission :** inconnu ; **Espèces concernées :** porc

① Les autorités de la région de Tioumen ont commencé à abattre des porcs élevés dans des exploitations familiales en réponse à une épidémie. Bien que les responsables vétérinaires régionaux n'aient pas publiquement identifié la maladie, des informations locales suggèrent qu'il s'agirait de la PPA. Les premiers cas auraient été détectés dans le village de Skarednaya au début du mois d'août, et des mesures de contrôle ont depuis été étendues à Golychmanovo, Abatskoïe, Omutinskoïe et d'autres localités touchées.

Pour en savoir plus

Évaluation moyenne	2,1 - 2,3
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	7

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie</u>	<u>Nombre de signaux : 09</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 09</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0</u>
- En date du 17 août 2026, l'Australie a confirmé 251 cas d'IAHP H5 chez des oiseaux sauvages : 10 en Australie-Occidentale, 169 en Australie-Méridionale, 4 en Nouvelle-Galles du Sud, 1 dans le Queensland, 62 dans le Victoria et 5 en Tasmanie L'Australie a détecté le virus IAHP H5 chez un skua antarctique et une sterne huppée en Tasmanie (premières détections positives chez des oiseaux sauvages) ; cette situation suscite des inquiétudes quant aux risques pour les espèces menacées, notamment le diable de Tasmanie et la perruche à ventre orange (espèce migratrice) L'Australie va mettre en œuvre un programme de vaccination ciblant ses oiseaux indigènes les plus vulnérables, y compris les espèces sauvages et les oiseaux en captivité - En Australie, un manchot de Phillip Island a été testé positif à l'IAHP H5N1. Les autorités ont confirmé que 5 000 des 37 000 manchots recevront un vaccin en deux doses, seront pucés et feront l'objet d'un suivi - L'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, en Australie, surveille les modifications génétiques et les réassortiments potentiels avec des virus de l'influenza aviaire australiens qui pourraient entraîner un risque d'extinction pour les espèces vulnérables si le virus H5N1 venait à s'implanter - La Nouvelle-Zélande n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée			
<u>Rage au Canada</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 16</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,9</u>
Le Québec a confirmé un deuxième cas de chat atteint de la rage du raton laveur dans la région de la Montérégie, soit la même région où le premier cas de rage du raton laveur chez un chat avait été identifié en juillet			
<u>Peste porcine africaine en Europe</u>	<u>Nombre de signaux : 10</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 190</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,9</u>
- La Finlande a signalé de nouveaux cas de PPA chez des sangliers dans la région de Virolahti, portant le nombre total de cas à 19 La Roumanie, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Hongrie et la Pologne ont signalé des foyers de PPA chez des porcs domestiques L'Italie, la Pologne, la Hongrie, la Lettonie, la France, l'Allemagne, la Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Croatie et la Moldavie ont signalé de nouveaux cas de PPA chez des sangliers			
<u>Maladie de Lyme et anaplasmose au Canada</u>	<u>Nombre de signaux : 01</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 08</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,7</u>
Depuis le début de l'année, le Nouveau-Brunswick a signalé 53 cas de maladie de Lyme et 10 cas d'anaplasmose; l'an dernier, la province a signalé 212 cas de maladie de Lyme (24,2 cas pour 100 000 habitants) et six cas d'anaplasmose			
<u>Myiase à Cochliomyia hominivorax au Mexique</u>	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 72</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,7</u>
- Au 15 août 2026, le Mexique a signalé un total cumulé de 38 382 cas d'infestation par la MCH chez les animaux, répartis sur 29 États ou régions - L'État de Chihuahua continue de signaler de nouveaux cas de MCH, avec des détections récentes à Matachi et Samalayuca (près de la frontière avec le Texas et le Nouveau-Mexique) - Le Senasica a récemment lâché environ 15 millions de mouches stériles dans sept municipalités de Chihuahua afin d'éradiquer la MCH - Le Mexique a signalé 470 cas d'infestation par la MCH chez l'humain depuis le début de l'année 2026			
<u>Orthobunyavirus apparenté au virus Shamonda en Europe</u>	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 03</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,0 - 2,7</u>
- La France a signalé de nouvelles détections du virus apparenté au virus Shamonda, avec un premier cas recensé dans la Manche (plus au nord que tous les foyers précédents, qui étaient concentrés aux frontières avec l'Allemagne et la Suisse) - Selon le dernier rapport de l'ESA, le virus a été identifié par RT-PCR dans 13 départements français (Ain, Ardennes, Calvados, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Savoie et Haute-Savoie) L'Allemagne a signalé de nouvelles détections du virus apparenté au virus Shamonda, avec des cas confirmés chez des bovins dans les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Hesse			
<u>Virus Ebola Bundibugyo en Afrique de l'Est (RDC)</u>	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 10</u>	<u>Évaluation moyenne : 2,1 - 2,6</u>
- En date du 16 août 2026, la RDC a confirmé 4 945 cas de maladie à virus Ebola (MVE), dont 2 315 décès ; cela représente une augmentation de 101 nouveaux cas confirmés et de 53 décès depuis le rapport précédent du 15 août ; l'épidémie en RDC est celle qui progresse le plus rapidement et la deuxième plus meurtrière jamais enregistrée - L'épidémie de MVE s'est également propagée à une sixième province de la RDC, avec un premier cas signalé dans le Bas-Uélé chez une personne en provenance du Haut-Uélé			
<u>Myiase à Cochliomyia hominivorax aux États-Unis</u>	<u>Nombre de signaux : 04</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 11</u>	<u>Évaluation moyenne : 1,8 - 2,4</u>
- En date du 17 août 2026, l'USDA a confirmé un total de 46 cas de MCH dans deux États : le Texas (45) et le Nouveau-Mexique (1) ; au cours de la semaine écoulée, le Texas a signalé un nouveau cas de myiase à MCH chez un mouton dans le comté de Val Verde L'USDA a intensifié le recours à la surveillance par drone pour détecter les infestations par la MCH chez le bétail et la faune sauvage au Texas et au Nouveau-Mexique ; plus de 200 drones, initialement affectés à des opérations frontalières, ont été réaffectés à cette mission, réalisant plus de 1 200 vols et surveillant plus de 23 000 animaux L'USDA a annoncé que le centre de production de mouches stériles du Texas ouvrirait ses portes en avance sur le calendrier, au printemps 2027. - La FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence pour le Simparica TRIO (comprimés à croquer à base de sarolaner, de moxidectine et de pyrantel) afin de traiter les infestations par la MCH chez les chiens et les chats			
<u>Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord</u>	<u>Nombre de signaux : 05</u>	<u>Nombre de semaines dans le rapport : 230</u>	<u>Évaluation moyenne : 1,8 - 2,2</u>
- Le Canada n'a signalé aucun foyer d'IAHP chez les volailles domestiques au cours de la dernière semaine - Au cours de la semaine écoulée, l'USDA a signalé un foyer d'IAHP dans un élevage avicole commercial : dans le Dakota du Sud (1) - En date du 16 août 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1173 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Oklahoma (2), Kansas (4), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), Michigan (31), Texas (36), Colorado (64), Idaho (175) et Californie (773); Au cours de la semaine écoulée, deux nouveaux foyers ont été signalés au Texas(2) - Des chercheurs aux États-Unis travaillent à la mise au point de vaccins contre l'IAHP H5N1 pour les bovins laitiers L'Utah a signalé des cas d'IAHP H5N1 chez deux mouffettes rayées et un chat domestique en juillet 2026 - Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford			

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Influenza

- ◆ OFFLU : Introduction de la grippe aviaire hautement pathogène H5 en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec un risque d'impact sur les populations d'animaux sauvages et de propagation accrue en Océanie [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Pré-impression: *"Enhanced Pathogenicity and Contact Transmissibility of Human-origin Avian Influenza H5N1 Clade 2.3.4.4b Genotype B3.13 Compared to D1.1 in Ferrets"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Risk assessment of avian influenza A(H5N5) virus from the first human case using the ferret model"* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *"Acquisition of specific human respiratory tract binding by 2.3.4.4b H5N1 hemagglutinins requires multiple mutations"* [Pour en savoir plus](#)

Mpox

- ◆ Surveillance du Mpox par l'ECDC dans l'Union européenne/l'Espace économique européen (UE/EEE) – Rapport mensuel [Pour en savoir plus](#)

Myiase à *Cochliomyia hominivorax*

- ◆ Texas Animal Health Commission – Directives relatives au déplacement des animaux en lien avec la MCH [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ Pré-impression: *"It happened again – emergence of a Shamonda-like orthobunyavirus in Central Europe, 2026"* [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ Une étude financée par le SHIC examine l'orthoréovirus de mammifère, l'adénovirus et de nouveaux agents pathogènes au sein du cheptel porcin américain [Pour en savoir plus](#)
- ◆ FAO – Lignes directrices sur la préparation à la réponse d'urgence dans le secteur agricole en Europe et en Asie centrale [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 08/13/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 18/08/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 8 -14 août 2026, semaine 33 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)